



Knowledge grows

YaraVita[®] Mantrac[®] Pro

Bladgödselmedel mot manganbrist. Mantrac Pro har en bra mangan effekt och framför allt goda lagrings- och hanteringsegenskaper tack vare en helt ny formulering.

Bra lagrings- och hanteringsegenskaper

- Bättre hanteringsegenskaper.
Dunken töms snabbt och är lätt att rengöra.
- Bättre lagringsstabilitet.
Nytt dispergerings- och stabiliseringssystem gör att produkten förblir stabil under lång tid och bibehåller en god kvalitet även efter lagring.
- Jämn koncentration i spruttanken.
Nytt dispergeringssystem medför en snabb fördelning i sprutvätskan och att tanken och sprutan är lätt att rengöra.
- Bra mangan effekt.
Erfarenheter från svenska försök.

God blandbarhet

Bladgödselmedlen i YaraVita-sortimentet kan blandas med många ogräs- och växtskyddsmedel. Se www.tankmix.com eller Lantmännens Odlä.

Stabil för lagring

Mantrac Pro har en bra produktstabilitet och klarar därför lagring på ett bra sätt. Produktens flytegenskaper (viskositet) förändras något vid lagring.

Bättre mangan effekt

Resultat från ett manganförsök i vårvete utanför Kristianstad 2010. Mantrac Pro gav högre skörd än Mantrac Optiflo.

Näringsinnehåll	Gram/liter
Kväve N	69
Mangan Mn	508

Fysikalisk form: Suspension
Förpackning: 5 liters dunk



Fördelar:

- Goda hanteringsegenskaper
- God lagringsstabilitet
- Blandar sig lätt med vatten
- God mangan effekt
- God blandbarhet med växtskyddsmedel



YaraVita® KombiPhos™

Dosering och behandlingstidpunkt

Spannmål:

0,5-1,0 l/ha från 3-bladsstadiet till 2-nodstadiet. 1,5-2,0 l/ha vid stark brist. Upprepa behandlingen efter 8-12 dagar. På hösten kan det vara motiverat med 0,5-1,5 l/ha i höstsäd.

Vattenmängd: 100-200 l/ha.

Oljeväxter:

0,5-1,0 l/ha från 4-bladsstadiet t.o.m. stjälksträckningen. Behandling kan göras fram till att knopparna är synliga men ej utslagna. Undvik behandling efter begynnande blomning. På hösten kan det vara motiverat med 0,5-1,0 l/ha i 4-8-bladsstadiet i höstoljeväxter.

Vattenmängd: 150-200 l/ha.

Sockerbeter:

1,0-2,0 l/ha när betorna har 4-8 blad. Vid stark brist upprepa behandlingen efter 8-12 dagar.

Vattenmängd: 100-200 l/ha.

Potatis:

0,5-1,0 l/ha vid de 3-4 första behandlingarna mot bladmögel (då manganfria bladmögelmedel används). Behandla med 10 dagars intervall.

Vattenmängd: 200 l/ha.

Ärter, Bönor:

0,5-1,0 l/ha från 4-6 blad (10-15 cm höjd) till begynnande blomning.

Vattenmängd: 150-200 l/ha.

Majs:

1 l/ha vid 4-6 blad. Vid tydlig till svår brist, upprepa behandlingen efter 10-14 dagar.

Vattenmängd: 200 l/ha.

Jordgubbar:

1,0 l/ha i tidigt knoppstadium.

Vattenmängd: 200-500 l/ha.

Grönsaker:

1,0-2,0 l/ha vid tillräcklig bladyta. (Kål, morot, purjolök, lök): Upprepad behandling kan behövas med 10-14 dagars intervall.

Vattenmängd: 200-500 l/ha.

Sallad (friland):

0,8-1,0 l/ha tillförs så snart det finns en tillräcklig bladyta. Upprepad behandling kan behövas med 10-14 dagars intervall

Vattenmängd: 500 l/ha.

