



Knowledge grows

# CHECKLISTA inför skogsgödsling

- FASTMARK**  
Kvävegödsla bara fastmarker. På torvmarker (humustäcke tjockare än 30 cm) är det i huvudsak brist på fosfor och kalium.
- PODSOLJORDMÅN**  
Jordmånen ska vara en podsol. På mer mullrika marker, s.k. brunjordar, är det ofta ingen kvävebrist.
- STÅNDORTSINDEX 16–30 M**  
På magra marker blir det få extra kubikmeter, på riktigt bördiga marker blir tillväxteffekten osäker.
- MINST 80 % AV GRUNDYTAN SKA VARA BARRTRÄD**  
Det lönar sig sämre att gödsla lövskog.
- LÄGST FÖRSTAGALLRINGSSKOG**  
Lönsamheten blir störst ca 10–15 år före slutavverkning. Stickvägar krävs för spridning med SG-systemet.
- INGEN AVVERKNING ELLER GALLRING INOM GÖDSLINGEFFEKTPERIODEN (8–10 ÅR)**  
Tidigare åtgärder innebär risk att förlora en del av den förväntade tillväxten.
- FRISK OCH VÄLSLUTEN SKOG**  
Gödsla inte sjuka eller glesa skogar. De har låg tillväxt och tillväxtökningen blir därför liten.

